

Risques de dommages liés à la consommation de différentes substances Q45 Dr PAPET

Consommation de :	Alcool	Tabac	Cannabis	Héroïne	Cocaïne	Drogues de synthèses et Psychostimulants	Benzodiazépines
Les Dommages							
Consommation aiguë	Accidents, Violence, Homicide, Comportements sexuels à risque, Coma, Hépatite aiguë, Trouble du rythme cardiaque	Incendie, Conduite automobile en fumant, Absence sauf chez les cardiaques	Accidents, Ivresse cannabique, Délire, Anxiété, Agressivité	Troubles du comportement lors du sevrage, Overdose, Coma, Collapsus cardiorespiratoire, Risque de contamination infectieuse	Anxiété, Agitation, Agressivité, Délire de persécution, Overdose, Troubles cardiaques, Convulsions, Arrêt respiratoire	- Amphétamines, ecstasy : hyperthermie, déshydratation, convulsions, décès, hépatite, encéphalopathie, troubles anxieux, confusion - LSD : hallucinations, troubles délirants	Accidents, Syndrome de sevrage, Comportements sexuels à risque, Violence, Désinhibition paradoxale, Surdosage (parfois mortel en association avec d'autres psychotropes)
Pendant la grossesse	Embryo-foetopathie		Embryo-foetopathie	Embryo-foetopathie	Embryo-foetopathie	Embryo-foetopathie	
Consommation régulière :	Cancer (ORL, oesophage, foie), Cardiovasculaires (cardiomyopathie, hypertension), Digestif (cirrhose, pancréatite), Mortalité : 40 000 morts	Cancer (ORL, poumons, vessie), Pulmonaire (emphysème, bronchite chronique), Cardiovasculaire (angine de poitrine, artérite, infarctus, AVC), Mortalité : 60 000 morts , 50 % des consommateurs réguliers (>20 cigarettes par jour) mourront d'une complication du tabagisme	Pulmonaire (bronchite, emphysème, cancer), 4 joints = 20 cigarettes , Cardiovasculaire, Immunitaire	Infections (sida, hépatite), Dénutrition, Pulmonaire, Rénal, Immunitaire	Trouble cardiaque, Infections si injections	- LSD : absent - Amphétamines, ecstasy, PCP, anti-cholinergique, Kélamine, inhalants : moyen	Syndrome d'apnée du sommeil, Chute, Pérennisation des insomnies
Risque psychologique et psychiatrique	Détérioration, Suicide, Altération cognitive, Altération relationnelle, Dépression	Dépression lors du sevrage	Altération (attention, mémoire cognitive, relationnelle), Syndrome amotivationnel, Etats délirants rares	Anxiété, dépression, Suicide	Altération cognitive et relationnelle moyenne, Anxiété, dépression, Désintérêt élevé, Etats délirants rares	Altération cognitives et relationnelle (mal évaluée), Isolement, Désintérêt lié à la quantité et fréquence, Etats anxio-dépressifs, Etats délirants rares	Perte de motivation, Troubles cognitifs en cas de toxicomanies avérée
Risque Social	Désinsertion sociale Problèmes judiciaires	Tabagisme passif	Désinsertion social et scolaire Problèmes judiciaires	Désinsertion sociale Problèmes judiciaires	Désinsertion social et scolaire Problèmes judiciaires		Désinsertion
Les risques sont liés à :	<u>Certaines situations</u> : conduite automobile, grossesse <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'information</i> (H : 21 verres/semaine ; F : 14 verres/semaine) <i>Seuil d'intervention</i> (H :35 verres/semaine ; F : 21 verres/semaines) ; plus de 5 verres par occasion	<u>Certaines situations</u> :conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'information</i> : toute consommation, <i>Seuil d'intervention</i> :10 cigarettes/jour, fumer le matin	<u>Certaines situations</u> :conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'information</i> : toute consommation, <i>Seuil d'intervention</i> : consommation quotidienne, ivresse cannabique)	<u>Certaines situations</u> : conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'intervention</i> : toute consommation	<u>Certaines situations</u> : conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'intervention</i> :toute consommation	<u>Certaines situations</u> : conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation (alcool, médicaments, amphétamines, hallucinogènes, cocaïnes), Méconnaissance des produits et des doses, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'information</i> : toute consommation, <i>Seuil d'intervention</i> : en fonction des modalités de consommation	<u>Certaines situations</u> : conduite automobile, grossesse, <u>Certaines modalités d'usage</u> : Toute consommation avant 15 ans, association de produits/poly-consommation, Recherche d'excès, Usage auto-thérapeutique, <u>A la quantité et à la durée</u> : <i>Seuil d'intervention</i> : toute consommation hors des recommandations de l'AMM