



# Le malade suicidaire

---

Entendre

Prévenir

Prendre en charge



# Suicide

---

- Suicide : acte de se donner la mort
  - Désir de mourir
  - Désir d'échapper à des hallucinations
  - Obéissance à une idée délirante
- Tentative de suicide : TS :
  - Passage à l'acte suicidaire non fatal
- Idées de suicide :
  - Idéation suicidaire fugace
  - Idéation durable et envahissante
  - Idéation avec ébauche de réalisation




# Épidémiologie

---

- 120 000 TS / an en France
- 12 000 suicides /an
  - 8 800 hommes
  - 3 169 femmes
- 1ère cause de mortalité pour les 25-34 ans

# taux de suicide par sexe et âge






# Évolution du taux de suicide

---

- Après 1970 augmentation générale
  - 38% d'augmentation entre 1975 et 1985
  - Chez les plus âgés, l'augmentation a été plus importante pour les femmes que les hommes
- Dans les pays développés :
  - La France est parmi les pays les plus touchés
  - Suicide des adolescents et adultes jeunes préoccupant en 1970 en Europe et

# Taux comparatifs de suicide dans pays développés





# TS augmentation de l'incidence

---

- 1981 : France :
  - 140 pour 100 000 hommes
  - 260 pour 100 000 femmes
- Europe :
  - 220 pour 100 000 hommes
  - 460 pour 100 000 femmes
- Augmentation des TS dans les années 1970
- Stabilisation depuis 1980 ?



# Suicide et TS


---

- France : 7ème rang de la mortalité par suicide : 20,1/100.000
- Nb de décès par suicide supérieur aux AVP
- 1994 : Nb total de décès par suicide : 12.041
- Mortalité par suicide : 3H ou 1F
- Entre 15 et 24 ans le suicide représente la 2ème cause de décès


Entre 25 et 34 ans le suicide représente la 1ère cause



# Mortalité par suicide : France



# Poitou-Charentes/ France






# Poitou-Charentes

---

- 11% des femmes de 15 à 24 ans
- 13% des hommes de 15 à 24 ans
- 15% des femmes de 25 à 34 ans
- 19% des hommes de 25 à 34 ans
- décès par suicide : 3H pour 1F
- 1996 : 414 décès dont 17%  
d'adolescents et adultes jeunes (70)

# Enquête Union Régionale des Médecins libéraux 1998, 651 médecins, 229 S






## Délai entre dernière C et S URML 98

---

- 14,2% ont consulté un médecin dans la semaine précédente de S ou TS
- 15,4% ont consulté un MG dans la semaine précédant le geste
- 45,1% ont consulté un médecin dans le mois précédant
- 46,9% ont consulté leur Mg dans le mois précédant



# Caractères socio-démographiques

---

- Origine ethnique
- Niveau socio-culturel
- Milieu de vie
- Milieu scolaire et professionnel



# La tentative de suicide

---

- Pics de fréquence
- Prodromes et circonstances déclenchantes
- Moyen utilisé
- Lieu
- Gravité somatique



# Pathologies sous-jacentes

---

- Dépressions et mélancolie
  - Unipolaires comme bipolaires
  - Limité un temps dans la mélancolie par l'inhibition psychomotrice
- Psychoses schizophréniques
  - Défense contre l'angoisse de morcellement
  - Exécution froide détachée, bizarre et violente
- Troubles de la personnalité
  - États limites psychopathiques : pathologie du passage à l'acte
- Toxicomanies et alcoolisme
- Manifestations réactionnelles





# Facteurs de risque

---

- Facteurs familiaux
- Antécédents familiaux
- Facteurs individuels :
  - Problème de santé
  - Troubles du comportement
  - Consommation de produits
  - Événements de vie négatifs



# Conduite à tenir

---

- Diagnostic
- Évaluation par le MG
- Évaluation à l'hôpital général
- Hospitalisation
  - Objectifs et durée
- Avis psychiatrique indispensable
- Traitement et prise en charge